

令和2年4月
アグリ技研(株)

項目	5月			6月			7月			8月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
作業	親株の追肥・防除（二次苗）			採苗時期（受苗）			切離時期			苗仕上げ時期		

防除	立枯れ性やダニ類（タンソ・イオウ・ウドンコ・ハダニ、アブラムシ、ヨトウ）＊ウドンコには、 シリカ水（1000倍）の混用
----	--

肥料(育苗期)	親株に味太郎20g 又はグローアーM粒		苗株に味太郎5〜7g 30〜40日間隔 又はグロー	
	親株にアミクエ500倍+ウルル7号500倍 灌		苗株にアミクエ500倍+ウルル7号500倍 灌注	
	育苗期は、定期的に追肥、新カル元気1000倍葉面散布		徒長抑制・分化対策にPKゴー2000倍	
	苗の充実にPKゴー2000倍+クドグリーン500倍混用葉面			

肥料（元肥）	鮮彩ロング	8袋	ゆっくり遅効性には「味太郎」	マルチ前追肥に 味太郎 3～5袋
	豊作源	8袋		
	珪リン酸	3袋	土壤分析数値に応じて施肥	
	腐植酸	3袋		
	モンネン	3袋		
	カルタマQ	5袋		

ポイント	* 苗充実のために肥料切れは起こさない様に追肥を行う。「味太郎・ウルル液肥」 * 草勢は強いタイプなどで、根域や根張りは十分に対策を取る。「アミクエ・PKゴー」 * 花芽分化確認後に適時に定植する。「高温などで早植えを避けてなるべく遅植えとする」
------	---