

# 苺 育苗栽培管理（前半）について

令和4年4月  
 アグリ技研㈱

| 項目 | 5月            |    |    | 6月       |    |    | 7月   |    |    | 8月     |    |    |
|----|---------------|----|----|----------|----|----|------|----|----|--------|----|----|
|    | 上旬            | 中旬 | 下旬 | 上旬       | 中旬 | 下旬 | 上旬   | 中旬 | 下旬 | 上旬     | 中旬 | 下旬 |
| 作業 | 親株の追肥・防除（二次苗） |    |    | 採苗時期（受苗） |    |    | 切離時期 |    |    | 苗仕上げ時期 |    |    |

|    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 防除 | 立枯れ性やダニ類（タンソ・イオウ・ウドンコ・ハダニ、アブラムシ、ヨトウ）＊ウドンコには、 <b>シリカ水（1000倍）の混用</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------|

|         |                                 |  |                         |  |
|---------|---------------------------------|--|-------------------------|--|
| 肥料（育苗期） | 親株に味太郎50 g                      |  | 苗株に味太郎10 g    30～40日間隔  |  |
|         | 親株にアミクエ500倍＋ウルル7号500倍灌注         |  | 苗株にアミクエ500倍＋ウルル7号500倍灌注 |  |
|         | 育苗期は、定期的に追肥、カル元気1000倍葉面散布       |  | 徒長抑制・分化対策にPKゴー2000倍葉    |  |
|         | 苗の充実にP K ゴー2000倍＋クドグリーン500倍混用葉面 |  |                         |  |

|              |       |    |                                                        |
|--------------|-------|----|--------------------------------------------------------|
| 肥料（元肥）       | 鮮彩ロング | 8袋 | <div>ゆっくり遅効性には「味太郎」</div> <div>マルチ前追肥に味太郎<br/>3袋</div> |
|              | 豊作源   | 8袋 |                                                        |
|              | 珪リン酸  | 3袋 |                                                        |
|              | 腐植酸   | 3袋 |                                                        |
|              | モンネン  | 3袋 |                                                        |
|              | カルタマQ | 5袋 |                                                        |
| 土壌分析数値に応じて施肥 |       |    |                                                        |

|      |                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ポイント | ＊本年はランナーの発生も良好、乾燥気味で十分な灌水に努め追肥も置き肥と液肥を使用する。<br>＊前半から根張りには十分に対策を取る。 「アミクエ・P K ゴー」<br>＊花芽分化確認後に適時に定植する。 「高温などで早植えを避けてなるべく遅植えとする」 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|