

# 2月 イチゴ 栽培管理（2026）

アグリ技研（株）

| 日   | 生育期   | 肥培管理  |
|-----|-------|---|
| 1日  | 栄養成長期 | 「栄養成長期はアミノ酸や発根剤で調整しましょう」<br>・果実肥大促進に「ふとる」5kgや「カリっと」1kg。<br>・根域充実に「アミクエ」5~7日置き5~10kg灌水処理。<br>・草勢維持や生育促進は「コラーゲンラボ」5kg灌水処理。  |
| 2日  |       |   |
| 3日  |       |   |
| 4日  |       |   |
| 5日  |       |   |
| 6日  |       |   |
| 7日  |       | ・定期的に「カル元気」や「有機カルトップ」の施肥。<br>。(カルシウムは月に2~3回5kg)<br>・生育促進に「ウルル18号」5kg灌水処理。<br>・草勢維持に「コラーゲン・ラボ」500倍の葉面散布。<br>・3番果の整理作業・複合環境制御の充実。<br>・出蕾期に「ホウ素」100gの追肥。<br>・強草勢や肥大促進には「ふとる」5kg。 |
| 8日  |       |   |
| 9日  |       |   |
| 10日 |       |   |
| 11日 |       |   |
| 12日 |       |   |
| 13日 | 生殖成長期 | 《草勢に合った電照時間の設定をしましょう》<br>・環境制御と同時に水管理と追肥の重要性<br>・根域充実に「アミクエ」5~10kg灌水処理<br>・草勢維持に「コラーゲン・ラボ」500倍  |
| 14日 |       |   |
| 15日 |       |   |
| 16日 |       |   |
| 17日 |       |   |
| 18日 |       |   |
| 19日 |       | ・発根促進に「アミクエ」5~7日置き5~10kg灌水処理。<br>・定期的に「カル元気」や「有機カルトップ」の施肥。<br>。(カルシウムは月に2~3回5kg)<br>・肥大促進に「ウルル18号」5kgや「カリっと」1kg<br>・強草勢や肥大促進には「ふとる」5kg。                                       |
| 20日 |       |   |
| 21日 |       |   |
| 22日 |       |   |
| 23日 |       |   |
| 24日 |       |   |
| 25日 | ポイント  | 2番果の収穫期と3番果以降の連續出蕾で徐々に気温も上昇して草勢も強くなる反面に株疲れや成疲れで根域も制限されてきます、<br>定期的な発根剤の施肥や環境制御管理に努めましょう。  |
| 26日 |       |   |
| 27日 |       |   |
| 28日 |       |   |
| 29日 |       |   |
| 30日 |       |   |
| 31日 |       |   |